

## Черепаша кожистая.

Автор: Administrator  
19.10.2013 00:00 -

---



Кожистая черепаха относится к пресмыкающимся, занесенным в международную Красную книгу. Данный вид черепах является лидером по размерам и росту. В длину она может достигать 2-х метров, а в весе порой доходит до 600кг. Поперечный размах передних ласт составляет 3 метра.

Ласты черепах не имеют когтей. Панцирь сердцевидной формы, и с задней части имеет некоторое сужение. Голова пресмыкающегося большая, тупоконечная и большая. У этой черепахи голова не втягивается в панцирь. Верхняя челюсть оснащена крупными и острыми зубцами. Верхняя часть имеет темную иногда даже черную окраску. Самцы отличаются более длинным хвостом и узким панцирем.

Встретить кожистую черепаху можно лишь в открытом море. Лишь изредка черепаха приближается к берегам, и спустя небольшой промежуток времени вновь отправляется в родную стихию. Обитает этот вид пресмыкающихся в Атлантике, Тихом океане,

## Черепаша кожистая.

Автор: Administrator  
19.10.2013 00:00 -

---

Индийском океане. Есть данные, что кожистая черепаха появлялась и в наших водах: в Беринговом море, на Дальнем Востоке. Попадая в родную стихию, ведет себя довольно активно, перемещается с большой скоростью, весьма маневренно.

В питании черепаха неприхотлива и может употреблять в пищу любой доступный ей корм: медузы, водоросли, рыбы и т.д. Яйцекладка у кожистой черепахи происходит на берегах Карибского моря и на Цейлоне. Процесс откладки яиц довольно примечательный, но увидеть его удастся не многим, так как он происходит поздно ночью. Глубина выкапываемого в песке гнезда достигает одного метра. Туда она помещает 30-130 белых яиц круглой формы, диаметром 5-6см. За сезон у одной самки получается сделать 3-4 кладки с яйцами, причем делают они это настолько усердно, чтобы ни один из хищников, в том числе и человек, не смогли извлечь их из гнезда. Черепашки выходят в родное море спустя два месяца инкубации.