Головастая морская черепаха (Логгерхед)

Автор: Administrator
08.09.2019 00:00 -

Черепахи данного вида наиболее часто встречаются у берегов США, а также возле австралийского континента, кроме того, в районе островов носящих название Мизера. Общее количество имеющихся в данных областях головастых рептилий составляет порядка тридцати тысяч особей. В иных регионах они тоже попадаются на глаза, однако, значительно реже.

Говоря о физических характеристиках этих животных, следует сразу сказать, что маленькими их не назовёшь. Ибо при максимальной массе тел почти в полтора центнера, они могут вырастать в длину до одного метра двадцати пяти сантиметров.

Головная часть у логгерхеда выражено большая, оснащённая мощным костяным клювом, используя который, данный морской зверь запросто способен разламывать даже очень прочные раковины, добывая из них моллюсков и прочих мелких, небольших существ. Кроме того, арсенал рептилии включает в себя когти, расположенные на плавниках. Также у данного обитателя водной пучины имеется немало нательных покровов, весьма похожих на щитки. Они находятся даже в районах глазниц. У мужских особей этой черепашьей разновидности присутствуют весьма заметные на вид хвосты. Что касается окраса панцирного образования, то сверху он являет собой гамму, включающую в себя тёмно-красный цвет, плюс к этому коричневый и довольно часто встречающийся оттенок оливы. Описывая его нижнюю часть, отметим, что она обычно кремовая.

В море живёт, в море умрёт, на сушу её только для размножения влечёт.

Явно выраженной физиологической особенностью логгерхеда является его приспособленность к подводному обитанию, которому он предаётся практически всю свою жизнь, вылезая на берег только в случае возникновения нужды в откладывании яиц. В вопросах питания головастая рептилия всеядна, а это значит, что, являясь существом откровенно хищным, она запросто может утолить голод водорослями. Притом, что в основном предпочитает мясную диету, в которую входит, в общем-то, всё, что она может поймать и съесть. В ход идут не только вышеупомянутые моллюски, но и раки, крабы, кальмары, любая, какая только попадётся, рыба и даже всем известные медузы.

С приходом сезона размножения, черепахи начинают подыскивать для себя удобные места на этот счёт, как правило, расположенные в субтропических регионах, реже в широтах, которым свойственен умеренный климат. Нередко этот процесс связан с миграциями, осуществляемыми на большие расстояния. Непосредственное его осуществления происходит в водной среде и сопровождается обычно в таких случаях используемыми, ритуальными, угрожающими покусываниями. После чего, дело продолжения рода полностью ложится на плечи будущих мамаш. Которые, предварительно выносив потомство, и подыскав для его размещения тихие, по их мнению, берега, с наступлением ночи совершают вылазки на сушу, дабы сформировать кладки. Гнездо представляет собой ямку в песке, которая потом зарывается. Срок вызревания детёнышей составляет не больше двух месяцев и зависит от температуры грунта. За ними никто, кроме хищников не присматривает, а потом с первого своего дня они сразу начинают играть в выживание.