

## Средиземноморская черепаха

Автор: Administrator

16.12.2011 00:00 - Обновлено 11.07.2013 11:26

---



У средиземноморской черепахи средняя длина составляет 30см, самцы же имеют более скромную длину – 23 см. У нее имеется высокий в виде купола карапакс. Он может иметь любой оттенок от желтого до оливкового. На щитках располагаются пятна черного цвета. Иногда, если пятна сливаются между собой, то окрас черепахи становится черным. Сверху голова покрыта крупными щитками. Хвост короткий, тупой. На передних лапах черепахи 5 пальцев, а задние имеют форму конической «шпоры». У молодых особей более светлый окрас, чем у взрослых черепах. На сегодняшний день средиземноморские черепахи занесены в Красную книгу РФ.

В поисках лакомой пищи, в частности сочных плодов, черепахи могут посещать поля и сады. Ее рацион питания очень разнообразен. В большей части он включает сочную зелень. Но так же порой черепаха вносит разнообразие в виде червей, улиток, а так же мелких насекомых. Летняя активность сменяется зимней спячкой, которую она проводит в норах, расщелинах камней, скал, или же в неглубоких норах. Но уже в феврале – марте ее можно встретить активной. Ведь настало время активного спаривания, которое происходит достаточно бурно.

Самка черепахи старается избежать ухаживания самцов, и устремляется в бегство, прячется в зарослях травы, лоза. Но чрезмерно возбужденные самцы всячески стараются выудить самку из ее убежища, порой весьма грубыми способами, например, кусая за задние конечности или ударяя своим щитом. Самец при акте спаривания сильно вытягивает шею и издает рычащий хрип. Если в брачном периоде за одной самкой ухаживают два самца, то за право обладать самкой могут происходить жестокие драки, во время которых самцы вырывают друг у друга куски мяса. Спаривание может продолжаться до 8-10 раз в день, причем одну самку могут

## Средиземноморская черепаха

Автор: Administrator

16.12.2011 00:00 - Обновлено 11.07.2013 11:26

---

оплодотворить сразу несколько самцов.

Яйца черепаха откладывает в июне-июле, по 2-8 штук в кладке. И уже через пару-тройку месяцев из них появляются маленькие черепашки. Но на поверхности их можно будет увидеть только через год, когда они окрепнут и немного подрастут