Малая косатка.

Автор: Administrator
11.02.2014 00:00 - Обновлено 19.03.2014 07:36

Млекопитающее из отряда китообразных, малая косатка, именуется так же черная косатка, относится к семейству дельфиновых. Животное имеет темно-серый или черный окрас, и на его нижней, брюшной стороне имеется полоска белого цвета.

Тело вытянутое, с округлой головой, где верхняя челюсть значительно больше нижней.

Внешний вид

Длина взрослого самца составляет 3,7-6,1метра, тогда как самки 3,5-5,0 метра при весе 920-1840 кг. При рождении малая косатка имеет длину не более 1,9метра и вес 80кг. Обитает животное в умеренном и тропическом море. Хотя основную часть времени проводят на глубине (до 2км), иногда эту косатку можно увидеть и недалеко от берега.

Обитают косатки не по одиночке, а группами, причем общее число их может достигать нескольких сотен. Но, как правило, большая группа всегда разбивается на более мелкие подгруппы по 10-30 малых косаток. При общении между собой используют принцип эхолокации.

Питание

Питается малая косатка кальмарами, рыбой (скумбрия, лосось, окунь), морскими млекопитающими (морские львы, тюлени). Так как передвигается животное довольно быстро, то ей не составляет труда охотиться на свою добычу.

Косатки относятся к животным, которые не имеют определенного периода для размножения, но все же пик спаривания приходится на начало весны и спустя 11-15,5 месяцев на свет рождается один китенок, который живот рядом с матерью два года. Перерыв между беременностями у самок составляет 7 лет. Повзрослевший китенок, даже после отлучения от груди, живет в стае, где и его мать. Самцы достигают половой зрелости к 8-10 годам, тогда как самки – в 8-11 лет.

Малая косатка истребляется в Японии для пропитания (жир, мясо). Погибают эти животные, и, запутавшись в сетях, оставленных рыболовами. Причиной смерти может стать пластиковая посуда и подобный мусор, попав в организм животного.