Автор: Administrator
22.12.2015 00:00 -

Ленки обитают от Енисея до Колымы во всей Восточной и Средней Сибири, в северной части Азии. Его можно встретить в бассейне Тихого океана, в таких реках, как Тугур, Уда, Амур, а также во многих водотоках на северо-западе Сахалина и Приморья.

Ленок не водится на Камчатке, Чукотке и Аляске. За пределами России эту пресноводную рыбу можно встретить в Монголии, в водотоках бассейна Верхнего Амура и озера Байкал, в северных провинциях Китая, в правых притоках Амура.

Внешний вид пресноводной рыбы Ленок

Эта рыба по внешнему виду напоминает европейскую форель-пеструшку, которую иногда по-английски называют – сибирская форель. В отличие от других лососевых, у ленка намного больше относительные размеры, у него очень большой жировой плавник. У ленка различают две формы: тупорылую и острорылую. Большинство ученых относят их к самостоятельным видам. Обыкновенный или тупорылый ленок имеет научное название Brachymystax lenok. У него челюсти равной длины и конечный рот. У

тупорылого ленка окраска бывает от светло-оливковой и до красно-коричневой. Его тело, жировой и спинной плавники покрыты черными пятнами размером где-то со зрачок, расположенными равномерно.

Острорылый ленок носит название Brachymystax savinovi, у него заостренная верхняя часть нависает над нижней, этот рот называется полунижним. Острокрылый ленок имеет такую же окраску, как и тупорылый ленок, но только размытые малиновые пятна видны на его боках. Оба эти вида обитают во многих речных бассейнах, но острорылый ленок водится только в Колыме. Довольно много тупорылого венка обитает в реках Тугур и Уда, в бассейне Амура, но в них немного водится острорылого ленка.

Оба вида ленка обитают в бассейне реки Лены, но острорылый ленок только водится в горной реке бассейна Лены на высоте 500 м над уровнем моря. Тупорылый ленок может достигать крупных размеров, его вес может составлять до 8-9 кг, чаще всего такие рыбы весят от 1 до 2 кг. Вес острорылого ленка довольно редко достигает 3 – 4 кг. Ленки обитают в водотоках предгорного и горного типа, в проточных озерах с чистой водой. В зимнее время ленок обитает в больших реках, а во время подъема воды зрелые особи уходят в притоки для нереста. В весеннее время мелкие незрелые рыбы заходят в притоки, но в летнее время некоторая их часть обитает в районе зимовок.

Ленок размножается в мае на Дальнем Востоке и юге Сибири, а в июне – в северной части ареала. Особи после нереста довольно долго обитают в притоках для нагула, затем по течению скатываются в основную реку. Пресноводная рыба ленок по характеру питания похожа на сибирского хариуса, поскольку способна поедать любую животную пищу, но в ее рационе значительную роль играют беспозвоночные, прежде всего, насекомые и их личинки. Хариус довольно редко достигает больших размеров в тех местах, где водится много ленка. Это связано с пищевой конкуренцией крупного хариуса и ленка, поскольку у них очень похожи экологические ниши. Тупорылого ленка можно назвать самым слабым среди всех лососевых рыб.