

Лунь степной.

Автор: Administrator
16.05.2015 00:00 -



Лунь степной относится к хищным птицам из отряда ястребиных. Птица имеет вес 310-550г и длину тела 43-52см. Размах крыльев достигает 99-120см. Внешне самки имеют более крупные размеры, по сравнению с самцами (немного крупнее вороны).

Внешний вид

Эта птица легкого сложения с длинными тонкими ногами. Этот вид степного луня, как и остальные представители луней, имеет «ошейник» из жестких перьев, который обрамляет лицевую часть головы. На четвертом году жизни самцы бледно-сизую спинную часть, белое надхвостье с поперечным рисунком. Маховое перо с белым основанием, второе-шестое имеет черную вершину. Средние рулевые перья серые, а у остального пера белый цвет с серой полоской. Брюшная часть белая с небольшим сизоватым налетом в области зоба и горла. У молодых птиц окрас схожий со взрослыми.

Лапы и восковица желтые, а когти и клюв черные. У взрослых птиц желтая радужина, а

Лунь степной.

Автор: Administrator
16.05.2015 00:00 -

у молодняка – бурая.

Распространение

Лунь степной распространен на территории Евразии от долины р. Дунай до Северо-Запада Монголии, Юго-Западной части Забайкалья. Так же лунь степной обитает к северу на территории между Уральским хребтом и долиной р. Енисей.

Населяет птица открытый ландшафт (полупустыни, степи), а так же может встречаться в лесостепи, в долинах рек и среди сельхозугодий.

Гнездование

Лунь степной относится к перелетным, гнездящимся птицам, причем пару создает себе на весеннем пролете. Может создавать гнездо на кочках, непосредственно на земле или на заломах тростника. Кладка осуществляется в мае, и в одном гнезде до 3-6 яиц белого цвета. Иногда на яйцах заметны бурые отметины. Если вся кладка погибает, то пара создает вторую дополнительную кладку яиц. В насидке принимает участие лишь самка, и в течение месяца самец кормит ее. На зимовку птицы собираются в августе-сентябре.